

## Bulbul červenouchý (*Pycnonotus jocosus*)

České synonymum: drozdec červenouchý


Anglické jméno: Red-whiskered Bulbul

Čeleď: Pycnonotidae



Obr 1: Bulbul červenouchý. Foto: Shiva Shankar

**Původ:** Původním areálem výskytu je jižní Čína, Indie a jihovýchodní Asie.



Obr 2: Rozšíření b. červenouchého v Evropě. Zdroj: <https://easin.jrc.ec.europa.eu/spexplorer/search/>

**Sekundární rozšíření:** Druh byl zavlečen do mnoha zemí mimo svůj původní areál rozšíření. V Evropě se vyskytuje ve Španělsku, Belgii a Německu. Zavlečen byl také do Austrálie nebo do USA.

**Rozšíření v ČR:** Nevyskytuje se.

**Cesty zavlečení:** Únik z chovů, neúmyslné zavlečení s dopravou.

**Popis:** Měří 17–23 cm a váží cca 20–40 g. Mezi typické znaky patří výrazná červená skvrna za okem a červené podocasní krovky. Barva těla je hnědá, břicho a krk jsou bílé. Hlava je černá, s charakteristickou špičatou chocholkou. Nohy a prsty na nich jsou obvykle krátké a tenké. Samci a samice mají podobnou barvu. Nedospělým jedincům chybí červená skvrna za okem. Bulbulové se živí ovocem a drobným hmyzem. Samice snáší 2-3 vajíčka, inkubace trvá 11-12 dní. O mláďata se starají oba rodiče cca dva týdny. Zhruba po třech týdnech jsou mláďata zcela nezávislá. Nejdelší zaznamenaná délka života dospělého jedince ve volné přírodě je 11 let. Bulbul červenouchý přirozeně obývá okraje lesů, obdělávané plochy, městské parky a zahrady. V introdukovaném areálu rozšíření se vyskytuje převážně v příměstských oblastech, parcích a zahradách. Je dobře adaptován na lesní a křovinaté biotopy. Bulbulové hnízdí v keřích, malých stromech, živých plotech a verandách budov nebo na jiných dostupných římsách či jiných místech několik metrů nad zemí. Šíří se nejen v člověkem osídlených oblastech, vysokého počtu dosahují i na odlehlých a lidmi neobydlených ostrovech.



Obr 3 : Bulbul červenouchý. Foto: Raman Kumar



Obr 4: Bulbul šupinkový. Foto: Timothy A. Gonsalves.



Obr 5: Bulbul žlutořítý . Foto: J.J. Harrison.

**Možnosti záměny:** Ostatní zástupci rodu *Pycnonotus* mají buď hnědě, nebo žlutě zbarvené podocasní krovky. Jediný zástupce, který má také červený zadeček, je bulbul šupinkový (*Pycnonotus cafer*), který je ale větší, tmavší a na hlavě nemá špičatou chocholku a červený pruh za okem.

**Riziko:** Mezi hlavní rizika patří konkurence s původními druhy, bulbul se vyznačuje svou agresí vůči ostatním druhům ptáků. V některých oblastech výskytu bylo zaznamenáno jeho predanční chování na drobnějších druzích pěvců (např. kruhoočkovitých – Zosteropidae na Mauriciu). Způsobuje také škody v zemědělství a může šířit invazní druhy rostlin.

**Likvidace:** Používají se živolovné pasti typu „camembert“, u kterých se průchod do pasti zužuje, a ptáci by neměli být schopni dostat se ven. Pasty musí být ideálně denně kontrolovány. Jako návnada se používá ovoce, údajně nejlépe červené barvy. V některých zemích se osvědčily stejné pasty, které se doporučují na odchyt majny obecné (viz infokarta k tomuto druhu). Po odchytu probíhá humánní usmrcení. Možným řešením je také odstřel, který je vysoce selektivní, když je prováděn odborníky. Na Novém Zélandu došlo mezi lety 1952-1955 k eradikaci druhu. Ornitologické nárazové sítě jsou neselektivní, proto jejich používání není vhodné (pouze je-li zajištěn stálý dozor a vypouštění necílových druhů). Chemická likvidace (např. Starlicid) je možná, např. v Americké Samoí byla úspěšná, avšak v EU je užití dotyčných chemikálií zakázáno.

#### Zdroje:

Avibase – Databáze světových ptáků, 2026. Dostupné z: <https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F9E375109E961EAC>

Li H, Zhang MX, Yang XJ, Cui LW, Quan RC. The breeding biology of Red-Whiskered Bulbul (*Pycnonotus jocosus*) in Xishuangbanna, southwest China. *Dongwuxue Yanjiu*. 2015 Jul 18;36(4):233-40. doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.4.233. PMID: 26228474; PMCID: PMC4790259.

Global Invasive Species Database (2026) Species profile: *Pycnonotus jocosus*. Downloaded from <http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=1230> on 12-01-2026.

Zoo Praha, bulbul červenouchý, 2026. Dostupné z: <https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat?d=87&start=87>

Obr 1: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-whiskered\\_Bulbul-web.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-whiskered_Bulbul-web.jpg)

Obr 3: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red\\_Whiskered\\_Bulbul\\_-\\_Pycnonotus\\_jocosus\\_Apr07\\_010.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Whiskered_Bulbul_-_Pycnonotus_jocosus_Apr07_010.jpg)

Obr 4:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red\\_Vented\\_Bulbul\\_IIT\\_Mandi\\_Himachal\\_Mar20\\_D72\\_1435\\_9.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Vented_Bulbul_IIT_Mandi_Himachal_Mar20_D72_1435_9.jpg)

Obr. 5: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pycnonotus\\_goavier\\_-\\_Kent\\_Ridge\\_Park.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pycnonotus_goavier_-_Kent_Ridge_Park.jpg)

**Citace:** Čolobentičová L., Görner T. 2026. Bulbul červenouchý (*Pycnonotus jocosus*), informační karta, AOPK ČR, Dostupné na: <https://invaznidruhy.aopk.gov.cz/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu>